



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 08-08-2023

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-08-08 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-08-09	2023-08-10	2023-08-11	2023-08-12	2023-08-13
वर्षा (मिमी)	45.0	65.0	60.0	45.0	40.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	30.0	30.0	31.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	26.0	25.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	65	75	65	65
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	12	14	8	8	12
पवन दिशा (डिग्री)	140	70	130	70	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	8	7	6	8

### मौसम सारांश / चेतावनी:

पिछले सात दिनों (1-7 अगस्त) में 34.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30.0 से 34.5 डिग्री सेल्सियस और 25.8 से 27.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले सप्ताह अधिकांश दिन आसमान में बादल छाए रहे। सुबह की सापेक्षिक आर्द्रता 0712 बजे 86 से 95% के बीच रही और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता 1412 बजे 64 से 90% के बीच रही। हवा की गति 0.4 से 2.6 किमी प्रति घंटा रही और हवा की दिशा अधिकतर उत्तर और उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर थी। 13 अगस्त तक आने वाले पांच दिनों का पूर्वानुमान मध्यम से भारी वर्षा (40-65 मिमी) दर्शाता है जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30-32 डिग्री सेल्सियस और 25-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की गति 8-14 किमी प्रति घंटा के बीच होगी और हवा की दिशा अधिकतर दक्षिण-पूर्व होगी। 9 और 10 अगस्त को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/आंधी तूफान आने की संभावना है। 8, 11 और 12 अगस्त, 2023 को उधम सिंह नगर में कई स्थानों पर इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। चेतावनी: 9 अगस्त के लिए आंधी/बिजली और तीव्र बारिश के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने के संबंध में एक ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और उसी स्थिति के संबंध में 8 और 10 अगस्त के लिए पीला अलर्ट जारी किया गया है। 11 और 12 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर आंधी/बिजली गिरने और तीव्र बारिश की घटना के संबंध में येलो अलर्ट दिया गया है।

### सामान्य सलाहकार:

27 जुलाई से 2 अगस्त तक राज्य के लिए वास्तविक वर्षा 67 मिमी थी जो सामान्य वर्षा (102 मिमी) के मुकाबले 34% की कमी दर्शाती है। 4-10 अगस्त के लिए विस्तारित सीमा पूर्वानुमान से पता चलता है कि राज्य में 99 मिमी सामान्य वर्षा के मुकाबले 58 मिमी बारिश हो सकती है जो 41% की कमी का प्रतिनिधित्व करती है। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक जिलेवार साप्ताहिक वर्षा 99 मिमी थी जिसे सामान्य वर्षा की श्रेणी में रखा गया है और 4-10 अगस्त के लिए अनुमानित वर्षा को कम श्रेणी में रखा गया है। जिले और राज्य के लिए वर्षा पैटर्न स्पष्ट रूप से अत्यधिक परिवर्तनशील वर्षा पैटर्न को दर्शाता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान आदि की जानकारी के लिए "मेघदूत ऐप" डाउनलोड करें बिजली संबंधी जानकारी पाने के लिए कृषि मौसम संबंधी सलाह और "दामिनी ऐप"। मेघदूत और दामिनी ऐप्स कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर (Android उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (iOS उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे उन्हें मदद मिलेगी कृषि गतिविधियों के संबंध में सही निर्णय लेना।

**लघु संदेश सलाहकार:**

जिले में मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है इसलिए खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए और तदनुसार खेती की गतिविधियां की जानी चाहिए।

**फ़सल विशिष्ट सलाह:**

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान के खेत की निराई-गुड़ाई 20 और 40 दिन के अन्तराल पर करनी चाहिए। यदि श्रमिक उपलब्ध नहीं है तो खरपतवारनाशी का प्रयोग इष्टतम नमी की स्थिति में किया जाना चाहिए। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाये रखें एवं सभी खेती गतिविधियाँ पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।
गात्रा	आवश्यकता अनुसार फसल की दूसरी बंधाई कर लेनी चाहिए और वह पहली बंधाई के 50 से मी ऊपर होनी चाहिए। दो पंक्तियों के तीन थानों की बंधाई एक साथ (कैची बंधाई) कर लेनी चाहिए। जल भराव की स्थिति में उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए और खेती संबंधित सारी गतिविधियाँ पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।
मक्का	मक्का में कम से कम दो बार निराई-गुड़ाई की जरूरत होती है, पहली 20 दिनों के अंतराल पर और दूसरी 35 दिन के अंतराल पर. मक्का के 2 फीट लंबा हो जाने पर यूरिया की टॉपड्रेसिंग करें. मैदानी क्षेत्रों में फॉल आर्मी वर्म के नुकसान से बचने के लिए क्लोरान्टा नीलीप्रोले 18.5 एससी का 0.4 मिली/लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। सभी रासायनिक छिड़काव और कृषि कार्य पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए।
मूँग	फसल में निराई-गुड़ाई का कार्य करना चाहिए और सभी कृषि कार्य पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए।
काला चना	फसल में निराई-गुड़ाई का कार्य करना चाहिए और सभी कृषि कार्य पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए।
मूँगफली	मूँगफली में बुवाई के 15 -20 दिनों के अंतराल पे निराई कर लेनी चाहिए और खरपवारों को रासायनिक विधि से नष्ट करने के लिये लिए पेंडीमिथलीन 30 ई. सी., 3. 3 ली. या एलाक्लोर 50 ई. सी. की 4 ली. मात्रा को 500 -700 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के बाद और खरपतवारों के जमाव से पूर्व छिड़कना चाहिए। जिप्सम की शेष मात्रा तथा बोरेक्स की सम्पूर्ण मात्रा फसल की 3 सप्ताह की अवस्था में टॉप ड्रेसिंग के रूप में बिखेर कर प्रयोग करें तथा हल्की गुड़ाई करके 3 -4 से मी गहराई तक मिट्टी में भली प्रकार मिला ले। कोई भी रासायनिक छिड़काव तथा खेती गतिविधियाँ पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
तिल	फसल में निराई-गुड़ाई करें और खेत में मिट्टी में इष्टतम नमी होने पर नत्रजन की टॉप-ड्रेसिंग करें। सभी कृषि कार्य पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	किसानों को पकी हुई टमाटर की फसल की तुड़ाई करनी चाहिए। वर्षा के बाद रोग लगने की संभावना रहती है इसलिए संक्रमित पौधों को नष्ट कर दें और रस-चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए सर्वदेशीय कीटनाशकों का छिड़काव करें। झूलसा रोग के प्रकोप से बचाव के लिए मैकोजेब 2.5 ग्राम/लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3.0 ग्राम/लीटर को पानी में घोलें और छिड़काव करें। किसान भाइ ध्यान रखें कि छिड़काव मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए करना चाहिए।
कद्दू	कद्दू वर्गीय फसलों की पत्तियों पर अनियमित आकार में पीले धब्बे दिखाई पड़ने पर पत्तियों को उलटकर निरीक्षण करें यदि निचली सतह पर हल्के धूसक रंग की फंफूदी की बढवार दिखाई दे तो नियंत्रण के लिए मेन्कोजेब 2.5 ग्रा0/ली0 की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। रसायनों का छिड़काव मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।
आम	आम के बीज/गुठली की बुआई का कार्य अगस्त के प्रथम पखवाड़े में जारी रखना चाहिए। एक वर्ष पुराने अंकुर पौधा की ग्राफ्टिंग किसी अन्य स्थान पर रोपने के बाद करनी चाहिए। खेती की सभी गतिविधियाँ पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशु के ब्याने के बाद अच्छी तरह से साफ-सफाई करके यूटरोटाने/ हरीरा/ गाइनोटोन नामक कोई एक दवा 200 मिली मात्रा से सुबह-शाम तीन दिनों तक गर्भाशय की सफाई हेतु देनी चाहिए।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशु के ब्याने के बाद अच्छी तरह से साफ-सफाई करके यूटरोटाने/ हरीरा/ गाइनोटोन नामक कोई एक दवा 200 मिली मात्रा से सुबह-शाम तीन दिनों तक गर्भाशय की सफाई हेतु देनी चाहिए।